



CSG/Porto Velho Coordenação de Serviços Gerais Porto Velho <csg@unir.br>

FICHA DOS PRODUTOS

1 mensagem

Imunizadora Protege <imunizadoraprotege@hotmail.com>

2 de junho de 2022 19:11

Para: CSG-PVO - Coordenadoria de Serviços Gerais em Porto Velho <csg@unir.br>

BOM DIA !!

SEGUE ANEXO FICHA TECNICA DOS PRODUTOS UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.

ATT,

IMUNIZADORA PROTEGE.

4 anexos



01 - rodilon-bloco-extrusado.pdf

19K



24753_ficha_tecnica_cipermetrina_25_ce_pm_ficha_tecnica.pdf

101K



CYMPERATOR 25CE. Cipermetrina.pdf

101K



RATOKILL.pdf

365K

Ficha Técnica RATOKILL® GRÃOS ESPECIAIS

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: RATOKILL Grãos

Especiais

Nome Comum: Brodifacoum

Categoria: Raticida Grãos

Registro Ministério da Saúde:

M.S 3.2781.0020

Composição química: 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos do agente tóxico (isca) e embalagens, envolvendo previamente os mesmos, usando luvas e sacos de lixo.

ARMAZENAMENTO:

Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos. Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco e ventilado.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nei Aparecido Padovan

CRQ: 04217828 – IV Região

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Cumarínico

Nome Comum: Brodifacoum

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018

COMPOSIÇÃO:

Brodifacoum0,005 %p/p
Benzoato de Denatônio0,003 % p/p
Atrativo, Diluente, Corante e Veículo.....99,992 % p/p

INDICAÇÕES DE USO:

RATICIDA RATOKILL, pronto para uso, é indicado para o controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos.

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Colocar os grãos dentro de caixas porta-isca próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias. Verificar após uma semana e reaplicar RATICIDA RATOKILL nos locais onde as iscas foram consumidas.

PRECAUÇÕES:

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO!

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Não coloque este produto em utensílios para uso alimentar.
- Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos.
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- Não se deve contaminar os cursos de água.
- Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes.
- As mulheres grávidas não devem aplicar o rodenticida.
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.
- Durante o manuseio, usar luvas e evitar o contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber nem fumar.
- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.
- RATICIDA RATOKILL é um rodenticida DOSE ÚNICA.
- Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância.

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

Em caso intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

Em caso de ingestão não provoque o vômito.

Marca Comercial: Rodilon® Bloco Extrusado

Nome Técnico: Difetialona

Grupo Químico: Benzotiopiranonas

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.3222.0038

N.º C.A.S.: 104653-34-1

Formulação: Isca

Concentração: I.A: Difetialona 0,0025% p/p; Inertes: Atrativos, antioxidante, agente amargante, aglutinante e corante 99,9975 % p/p.

Denominação Química: 3-[(1RS, 3RS; 1RS,3SR)-3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-1-benzothi-in-2-one.

Fórmula Bruta: C₃₁H₂₃BrO₂S

Dados Toxicológicos: Toxicidade aguda - DL50 oral (ratos): > 5000 mg/kg p.c; DL50 dérmica (coelhos): > 2000 mg/kg p.c.

Classe: raticida

Embalagem/Apresentação: Saco de 1kg (66/67 blocos de 15g).

OBS: Poderá haver variação no peso do bloco de 15g de aproximadamente 1g para mais ou para menos. Entretanto, o peso final do saco plástico será sempre de 1kg.

Indicações de Uso

Rodilon® Bloco Extrusado é um raticida anticoagulante de dose única em uma formulação inovadora para o controle de roedores especialmente em locais de alta umidade. Possui grande atratividade proporcionada pelos cereais integrais de alta palatabilidade e sua grande resistência a umidade. Devido a maior resistência e durabilidade do bloco os ratos consomem a isca por mais tempo e evita o desperdício da isca, havendo o consumo total pelo roedor.

É indicado para controle de camundongos, ratos e ratazanas em áreas urbanas e rurais. Eficiente em áreas abertas, locais com umidade (próximos à rede de esgoto) e áreas sujeitas a intempéries.

Modo de aplicação

As quantidades a serem administradas devem ser suficientes para que todos os roedores tenham a oportunidade de ingerir a isca ao menos uma vez. Indicamos dispor 2 ou mais blocos de Rodilon® Bloco Extrusado por ponto de aplicação a cada 5-10 metros, em locais onde se observam sinais da presença dos roedores (nas tocas e

locais de trânsito). A quantidade de blocos e o número de pontos de aplicação podem variar de acordo com o grau de infestação e o tamanho da área a ser desratizada. Manter a oferta do produto até que não se evidenciem mais sinais da presença de roedores.

Recomendações ao aplicador: Recomenda-se a colocação do produto dentro de portais que permitem o acesso exclusivo aos roedores, pois estes se sentem mais seguros comendo escondidos, além disso, o produto fica fora do alcance de crianças e animais não alvo.

Recomendações ao morador: Recomenda-se o aplicador orientar o morador a manter as crianças e os animais domésticos longe do produto.

Antídoto/ Tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: 0800 77 13 733

Telefone de Emergência Médica: 0800 70 10 450

TeleBayer: 0800 01 79 966

Observação

Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.

Cymperator®

Tradição e qualidade no controle de pragas.

- Inseticida Piretróide Concentrado Emulsionável e Pó Molhável.
- Eficaz contra baratas, formigas, mosquitos, moscas e cupins.



Barata sobre um alimento (bolacha)



À base de Cipermetrina, CYMPERATOR é um produto utilizado mundialmente no controle de insetos rasteiros e voadores.

EFICIÊNCIA

Com excelente efeito desalojante, associado ao seu forte impacto, CYMPERATOR expulsa os insetos do esconderijo e os derruba imediatamente (*knockdown*). Essa eficiência se mantém por muito mais tempo graças ao seu efeito residual.

RENDIMENTO

CYMPERATOR é econômico, 1 litro trata até 4 mil m² (dose padrão de 50 mL por 10 L de água), com eficiência contra insetos rasteiros e voadores.

SEGURANÇA

Com baixa toxicidade e alta eficiência, CYMPERATOR é um produto seguro para o aplicador, é biodegradável, não agride o meio ambiente, não deixa cheiro e não mancha.

VERSATILIDADE

CYMPERATOR apresenta-se em duas formulações:

CYMPERATOR 25CE (Concentrado Emulsionável)

Formulação líquida indicada para aplicação espacial (FOG e UBV) e de superfícies no controle de baratas, moscas, mosquitos, formigas e cupins.

CYMPERATOR 40PM (Pó Molhável)

Formulação em Pó Molhável recomendada para situações que requerem um maior efeito residual no controle de baratas e formigas. CYMPERATOR Pó Molhável é embalado na dose certa em sachês solúveis em água, reduzindo o contato do aplicador com o produto e facilitando a preparação da calda.

CYMPERATOR 40PM forma com CYMPERATOR 25CE a dupla infalível contra os insetos.

Cyperator®

Nome comercial: CYPERATOR

Nome comum: Cipermetrina

Classe: inseticida piretróide

Registro no Ministério da Saúde: CYPERATOR 25 CE: 3.0119.0006

CYPERATOR 40 PM: 3.0119.0037

AUP: CYPERATOR 25 CE: 2871/2004 - CYPERATOR 40 PM: 2443/2003

Formulação: Concentrado Emulsionável (CE) – formulação líquida

Pó Molhável (PM) – formulação em pó dispersível em água

Composição química: (RS) – a – ciano -3-fenoxibenzil (1RS) – cis, trans -3- (2,2-diclorovinil) - 2- 2-dimetil ciclopropanocarboxilato

Proporção: CYPERATOR 25 CE

• CIPERMETRINA.....25%p/p

• Ingredientes inertes.....71,6%p/p

CYPERATOR 40 PM

• CIPERMETRINA.....40%p/p

• Ingredientes inertes.....60%p/p

Características físicas: é fotoestável, não apresenta odor, não mancha e não é corrosivo.

Solubilidade: Concentrado Emulsionável (CE) – solúvel em água e óleo mineral

Pó Molhável (PM) – solúvel em água

Modo de ação: por contato e ingestão

Apresentação: CYPERATOR 25CE – caixa de 6 litros (6 frascos plásticos de 1 litro cada)

CYPERATOR 40PM – caixa de 4 quilos (4 cartuchos de papelão contendo 25 envelopes hidrossolúveis de 40g cada)

INSTRUÇÕES DE USO

CYPERATOR 25CE

Aplicar diluído em água ou outro diluente (óleo mineral) com pulverizadores manuais ou motorizados.

Aplicação Espacial

Fog portátil: para o controle de mosquitos, diluir 20 mL de CYPERATOR 25 CE por litro de diluente utilizado (óleo mineral). Aplicar 2 litros por hectare.

UBV portátil: para controle de mosquitos, diluir 40 mL por litro de diluente utilizado (óleo mineral). Aplicar 0,5 litro por hectare.

Aplicação de Superfície

Controle de moscas: diluir 50 mL de CYPERATOR 25 CE em 10 litros de água e aplicar uniformemente (200 m²) nas paredes, janelas, portas e demais superfícies lisas onde as moscas pousam.

Controle de baratas e formigas: diluir 50 mL de CYPERATOR 25 CE em 10 litros de água e aplicar uniformemente (200 m²) onde as pragas ocorrem e se escondem, tais como frestas, cantos, pisos, rachaduras etc.

Controle de cupins de madeira seca: diluir 50 mL de CYPERATOR 25 CE em 10 litros de água (ou outro diluente) e aplicar ou injetar em madeiras ou superfícies que se deseja proteger.

Controle de cupins subterrâneos: diluir 100 mL de CYPERATOR 25 CE em 10 Litros de água.

Tratamento pré-construção: antes da pavimentação, aplicar 5 litros da calda por m² sobre o solo. Após a construção da estrutura, fazer trincheira ao longo da mesma, com 15 cm de largura e 30 cm de profundidade; aplicar 5 litros de calda por metro linear.

Tratamento pós-construção: após inspeção, verificar as entradas e acessos dos cupins. Com a planta da edificação, perfurar o piso ao longo do perímetro das paredes e estruturas com furos a cada 30 cm.

CYPERATOR 25 CE			
Alvos biológicos/ aplicação	Qtde. produto/ L de calda	Qtde. i.a./área	Qtde. calda/área
Superfície			
Baratas, formigas, moscas	5 mL	62,5 mg i.a./ m ²	10 L de calda/ 200 m ²
Cupins de madeira seca	5 mL	62,5 mg i.a./ m ²	10 L de calda/ 200 m ²
Cupins subterrâneos	10 mL	12,5 g / m ²	5 L calda/m2 ou 5 L calda/m linear
Espacial			
FOG	20 mL	10 g / ha	2 L de calda/ ha
UBV	40 mL	5 g / ha	0,5 L de calda/ ha

CYPERATOR 40PM

Controle de baratas e formigas: diluir 1 sachê hidrossolúvel (40 g) em 10 litros de água e aplicar em 200 m² de superfície, principalmente em frestas, cantos, pisos, rachaduras etc. Utilizar pulverizadores manuais. Usar bico leque 80.02.

CYPERATOR 40 PM			
Alvos biológicos/ aplicação em superfície	Qtde. produto/ 10 L de calda	Qtde. i.a./área	Qtde. calda/área
Baratas e formigas	1 sachê (40 g)	80 mg/m ²	10 L de calda/ 200 m ²

Restrições de uso

- Uso exclusivo por empresas especializadas.
- O produto, quando aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

Vantagens de uso

- Altamente ativo contra espécies de insetos voadores e rasteiros como baratas, formigas, moscas, mosquitos e cupins.
- Apresenta uma ação rápida e fulminante.
- Baixa toxicidade.
- Longo período de poder residual.
- Não apresenta odor, não mancha e não corrói.
- CYPERATOR 25 CE é altamente versátil podendo ser utilizado em aplicações espaciais e de superfícies.
- CYPERATOR 40PM já vem embalado na dose certa, em envelopes solúveis em água, reduzindo o contato do aplicador com o produto.
- Biodegradável.

Informações para uso médico

- Grupo químico: Piretrinas e Piretróides
- Nome comum: CIPERMETRINA
- Ação tóxica: distúrbios sensoriais cutâneos, hipersensibilidade, neurite periférica.
- Antídoto e tratamento: anti-histamínico e tratamento sintomático.

Toxicologia:

CYPERATOR 40 PM

DL₅₀ oral aguda (ratos) > 1000 mg/kg

DL₅₀ dermal aguda (ratos)..... > 2000 mg/kg

CYPERATOR 25 CE

DL₅₀ oral aguda (ratos) > 812 mg/kg

DL₅₀ dermal aguda (ratos)..... > 4000 mg/kg

Precauções

- Durante a aplicação usar macacão com mangas compridas, botas, avental impermeável, luvas de borracha impermeáveis, viseira facial cobrindo o rosto e máscara nasal de proteção com filtro adequado contra vapores
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água fria e sabão
- Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais
- Em caso de intoxicação, procurar logo um médico e levar a embalagem do produto
- Não comer, beber ou fumar durante a aplicação
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários
- Durante a aplicação, não devem permanecer no local pessoas e animais
- No caso de ingestão NÃO induzir vômito
- Antes de descartar a embalagem vazia, realizar a tripla lavagem: colocar água limpa, tampar e agitar vigorosamente por cerca de 30 segundos. Repetir essa operação pelo menos 3 vezes, aproveitando a água da lavagem para preparo de calda inseticida
- Não reutilizar embalagens vazias
- Manter o produto na embalagem original
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado
- As embalagens vazias devem ser destruídas e enterradas em fosso para lixo tóxico. Fica proibido o enterro de embalagens em áreas inadequadas. Consultar o órgão estadual de meio ambiente
- Não jogar no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas
- Após a aplicação do produto, promover a aeração do ambiente por período superior a 4 horas: abrir portas e janelas e outros obstáculos à livre circulação de ar fresco
- Após a aplicação devem ser tomadas precauções para evitar que pessoas ou animais tenham contato com a área tratada: impedir a entrada durante o período de aeração
- Após a aplicação tomar banho e trocar de roupa. Não misturar a roupa contaminada com as de uso diário
- Cuidado! Evitar a inalação e proteger os olhos durante a aplicação

Antes de usar 'Cyperator', leia sempre as instruções do rótulo e da ficha técnica.



C.A.S.A. 0800 704 4304
CENTRO AVANÇADO SYNGENTA DE ATENDIMENTO
DÚVIDAS - SUGESTÕES - EMERGENCIAS

Av. das Nações Unidas, 18 001
São Paulo – SP – CEP 04795-900

syngenta

www.syngenta.com.br